

Spirometrijom do boljeg zdravlja

With spirometry to better health

Tajana Jalušić Glunčić,Ljerka Glad

Specijalna Bolnica za plućne bolesti,Rockefellerova 3,Zagreb

ključne riječi: SZO, KOPB, pušenje, smrtnost, spiometrija, javno zdravstvena akcija, prevencija

UVOD

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je u provedenom ispitivanju 1990. godine bila na 6. mjestu smrtnosti u svijetu s više od 2,2 milijuna smrtnih ishoda (4,4%-svih smrti u svijetu). Istraživanja SZO-e ukazuju na porast smrtnosti od KOPB-a, te je u 2001. godini bilo više od 2,7 milijuna smrtnih ishoda. Predviđa se da će se isti trend porasta smrtnosti od KOPB-a nastaviti te da će 2020. godine KOPB doći na 3. mjesto smrtnosti s 4,5 milijuna smrti. KOPB se nedovoljno često dijagnosticira,pomoć se traži već kada se vrijednosti plućne funkcije značajno smanje. A najvažnije je pravovremeno prepoznavanje,dijagnosticiranje i odgovarajuće liječenje KOPB-a. Za dijagnozu KOPB-a treba napraviti spiometriju koja je zlatni standard. Najčešći uzrok koji je odgovoran za tako značajni porast KOPB-a je dugogodišnje pušenje osobito u razvijenim zemljama. Zato je vrlo važna edukacija bolesnika i prestanak pušenja.2010.godina je i proglašena godinom pluća.Evropska zaklada pluća (ELF) je javni glas Evropskog udruženja za respiratorne bolesti (ERS),osnovan je 1990.godine u svrhu širenja informacija iz ERSa javnost i medije te za podizanje svijesti o zdravlju i bolesti pluća.Pod njihovim pokroviteljstvom diljem Europe se organiziraju testiranja spiometrijom u svrhu privlačenja pažnje medija i građana da se prepozna kronična opstruktivna plućna bolest.

CILJ I METODE


Vrlo jednostavnom,brzom i neinvazivnom pretragom- spiometrijom može se pravovremeno dijagnosticirati bolest. Zato smo se odlučili u godini pluća učiniti akcije puhanja spiometrije na raznim lokacijama u Zagrebu. Akcije su rađene 14.10.2010.povodom Svjetskog dana spiometrije na 3 mesta u Zagrebu (Cvjetni trg i trgovački centar Avenue Mall u Novom Zagrebu, te Specijalna bolnica za plućne bolesti), te 17.11.2010.povodom Svjetskog dana KOPB-a u trgovackom centru City One i Specijalnoj bolnici za plućne bolesti. Sa spiometrom koji je veličine prenosnog računala vrlo brzo i jednostavno se može učiniti veliki broj pretraga .Akcije su trajale od 10 do 16 sati bile su besplatne i mogli su je učiniti svi koji su izrazili želju. Akcija je rađena u suradnji naše ustanovi's gradom Zagrebom. Bile su

oglašavane 24 sata ranije putem medija (radija i televizije), kako bi se obavijestili građani. Tom prilikom im se je također mjerila i saturacija krvi s O₂ koja je također vrlo često snižena kod bolesnika koji boluju od KOPB-i. Uključeni su bili liječnici pulmolozi i medicinski tehničari. Svaki ispitanik je učinio spirometriju, izmjerio saturaciju te razgovarao s pulmologom, dobio savjete o prestanku pušenja, te prema potrebi i preporuku za daljnju obradu i liječenje, a neki su već i odmah dobili datum za pregled.

REZULTATI

Odaziv je bio jako dobar. U dvije akcije pregledano je 418 ispitanika. Podjednako su bili zastupljeni muški i ženski spol. Bile su zastupljene sve dobne skupine od đaka, studenata, radno aktivnog stanovništva do umirovljenika. Raspon godina kretao se od 19 godina do 86 godina. (graf 1,2,3.)


Akcije povodom Svjetskog dana spirometrije i KOPB-a



Graf 1

RAZDIOBA ISPITANIKA PO DOBNIM SKUPINAMA

56%



Graf 2


RAZDIOBA PO SPOLU



Graf 3

Među ispitanicima bio je 171 pušač.(graf 4)


Udio pušača



Graf 4

Od ukupno učinjenih spirometrija 98 spirometrija je bilo patoloških. 34 ispitanika su bila pušači i imali su patološku spirometriju (graf 5,6). Podjednaki broj pušača je bio u skupini od 41-60 godina, kao i u skupini od 61-86 godina, najmanje je bilo pušača u skupini od 19-40 godina (graf 7).

Postotak patoloških spirometrija




Graf 5

Povezanost pušenja i patološke spirometrije




Graf 6

RAZDIOBA PUŠAČA PO DOBNIM SKUPINAMA




Graf 7


RASPRAVA



Graf 8



Graf 9



Graf 10

Rezultati su pokazali da je kod nas još uvijek visoki udio pušača u ukupnoj populaciji. Ali zanimljivo je da je u skupini od 19-40 godina najviši postotak pušača (75%), nešto manji u skupini od 41-60 godina (53%), a najmanji u skupini od 61-86 godina (25%) (graf 8,9,10). Postotak patoloških spirometrija je 20% od ukupnog broja. Kako je za manifestnu bolest kod KOPB bitna dužina ekspozicije i broj cigareta na dan (pack/year) najviše patoloških spirometrija je nađeno u skupini od 41-60 godina i 61-86 godina. Iako je skupina od 19-40 godina imala najviši postotak pušača i to aktivnih imala je najmanji broj patoloških spirometrija što je i razumljivo jer je ekspozicija duhanskog dima kratka.

Od ukupnog broja učinjenih spirometrija, patoloških je bilo 23%, a u skupni kod pušača je bilo nađeno 20% patoloških spirometrija.

Prema istraživanjima puhanja spirometrije na nivou Evrope testirano je oko 12500 ljudi i u 20% je nađen neki stupanj opstrukcije.

U javno zdravstvenoj akciji u Berlinu 20% ispitanika je dobilo preporuku da se jave svome liječniku.

Naši rezultati iako su rađeni na znatno manjem broju pokazuju jednaku tendenciju patoloških nalaza kao i na nivou Evrope.